

GUIDO GRANDI

A proposito dei parassiti
della *Plodia interpunctella* Hb.

Nel 1929 il Dr. R. TOSI⁽¹⁾ indicò come parassiti della *Plodia interpunctella* Hb. 2 Braconidi: l'*Habrobracon brevicornis* Wesm. e l'*Opius carinatus* Thoms., in seguito a determinazione del Dr. O. SCHMIEDEK-NECHT di Blankenburg. Io ho riprodotto tali reperti nel volume delle mie lezioni⁽²⁾, ma il fatto, un po' strano, che una specie del gen. *Opius* fosse parassita di Lepidotteri, mi ha consigliato di far rivedere dal mio aiuto Dr. A. Goidanich il materiale originale, appartenente alle collezioni biologiche dell'Istituto da me diretto.

Dallo studio è risultato che le due pretese forme rientrano in un'unica entità specifica: l'*Habrobracon hebetor* Say (= *juglandis* Ashm.), confuso dagli AA. con l'*Habrobracon brevicornis* Wesm.

Come viene riferito in altra parte del presente volume questo *Habrobracon* è stato da noi ottenuto anche come parassita di un altro Piralidino, l'*Ephestia kuehniella* Zell.

⁽¹⁾ Tosi R. - *Contributo alla conoscenza di due Tignole del Grano: Plodia interpunctella* Hb. e *Tinea granella* L. - Boll. Lab. Entom. Bologna, II, 1929, pp. 292-300, 3 grafici (cfr. pag. 295).

⁽²⁾ Grandi G. - *Lezioni di Entomologia tenute nell'Anno Accademico 1929-1930*. Bologna, Tip. già Compositori, 1930, pp. 1-571 (cfr. pag. 366).