

DANTE FAGGIOLI

Tecnico del R. Istituto di Entomologia di Bologna

Appunti entomologici.

II.

Continuo ⁽¹⁾ la pubblicazione dei fatti degni di nota constatati negli allevamenti di Insetti che vengono eseguiti in questo Istituto.

EMITTERI

1. *Eriopeltis festucae* (Fonsc.)

(Coccidae)

Questa specie non è rara nei dintorni di Bologna sul *Brachypodium sylvaticum* R. S.

Essa è attaccata da un Imenottero Calcidide ⁽²⁾, il

Trichomasthus albimanus Thoms.

LEPIDOTTERI

2. *Cydia splendana* Hb.

(Tortricidae)

Sfarfallata dai frutti di *Quercus Robur* L. insieme con la *Cydia amplana* Hb. e con la *C. grossana* Hw. delle quali ho parlato nel mio primo contributo della serie (pag. 219).

⁽¹⁾ Faggioli D. - *Appunti entomologici*, I. - Boll. Lab. Entom. Bologna, IV, 1931, pp. 219-222.

⁽²⁾ Classificato dal prof. L. MASI.

Da questi allevamenti si sono ottenuti i seguenti parassiti:

1 *Imenottero Icneumonide* ⁽¹⁾

Pristomerus vulnerator Grav. var.

1 *Imenottero Braconide* ⁽²⁾

Phanerotoma dentata Panz.

3. *Tortrix forskaleana* L.

(Tortricidae)

Nell'allevamento di larve di questa specie viventi sull'*Acer campestre* L., gli adulti hanno cominciato a sfarfallare il 12 giugno 1932 ed hanno finito di fuoriuscire alla metà dello stesso mese. Dalle crisalidi è sfarfallato, una decina di giorni prima dei Tortricidi, un Dittero Larvevoride ⁽³⁾ parassita, l'

Eurysthaea scutellaris R. D.

(= *yponomeutae* Rond.)

4. *Rhyacionia buoliana* Schiff.

(Tortricidae)

Da materiale proveniente da Marano sul Panaro (prov. di Modena) è sfarfallato il Dittero Larvevoride ⁽⁴⁾

Exorista confinis Fall.

5. *Galleria mellonella* L.

(Pyralidae)

Larve di questa specie, ben nota come dannosa agli alveari, erano abbondantemente attaccate nei dintorni di Bologna da un Imenottero Calcidide ⁽⁵⁾ parassita ectofago gregario, il

Dibrachys boucheanus Ratz.

⁽¹⁾ Classificato dal Prof. H. BISCHOFF.

⁽²⁾ » » Sig. Dott. ATHOS GOIDANICH.

⁽³⁾ » » Dott. J. VILLENEUVE DE JANTI.

⁽⁴⁾ » » Sig. E. SÉGUY.

⁽⁵⁾ » » Prof. L. MASI.

6. *Vanessa urticae* L.

(Nymphalidae)

Questo Lepidottero è parassitizzato da vari Insetti.

Materiale proveniente dal Trentino (Pinzolo, Vigo di Fassa) ci ha dato in Laboratorio le seguenti specie:

3 *Imenotteri Icneumonidi* ⁽¹⁾

Hemiteles melanarius Grav.

Hoplismenus terrificus Wesm.

Ichneumon discriminator Wesm.

1 *Imenottero Calcidide* ⁽²⁾

Pteromalus puparum L.

1 *Dittero Larvevoride* ⁽³⁾

Sturmia vanessae R. D.

7. *Acherontia atropos* L.

(Sphingidae)

Una larva di questo Sfingide è stata uccisa da numerosi individui di un Dittero Larvevoride ⁽⁴⁾, la

Sturmia atropivora R. D.

Il 20 settembre fuoriuscivano dal suo corpo 61 larve del Dittero, che subito si impupavano vicino alla vittima.

Il 2 ottobre sono sfarfallati 32 adulti; gli altri sono tutti periti nell'interno del pupario.

8. *Thaumetopoea processionea* L.

(Eupterotidae)

Questa specie è combattuta nei dintorni di Bologna da un Dittero Larvevoride ⁽⁵⁾, la

Ceratochaeta caudata Rond.

(forma secunda B. B.)

che sfarfalla dalle crisalidi e che alle volte distrugge tutti gli individui di un nido.

⁽¹⁾ Classificati dal Sig. ERNST CLÉMENT.

⁽²⁾ Classificato dal Prof. L. MASI.

⁽³⁾ » » Dott. J. VILLENEUVE DE JANTI.

⁽⁴⁾ » » » » » »

⁽⁵⁾ » » » » » »

9. **Thaumetopoea pityocampa** Schiff.

(Eupterotidae)

Da materiale proveniente da Fiume si sono ottenuti numerosi esemplari di un Dittero Antomiide ⁽¹⁾ parassita, la

Muscina pabulorum Fall.

10. **Phalera bucephala** L.

(Notodontidae)

Da larve viventi sui Salici del nostro giardino sperimentale è fuoriuscito un Dittero Larvevoride ⁽²⁾ parassita, la

Compsilura concinnata Meig.

11. **Saturnia pyri** Schiff.

(Saturniidae)

Una crisalide, trovata nella campagna bolognese, è morta in seguito all'attacco di una ventina di larve di un Dittero Larvevoride ⁽³⁾, la

Masicera sylvatica Fall.

12. **Nygmia phaeorrhoea** L.

(Lymantriidae)

Dall'allevamento di individui raccolti nei dintorni di Bologna sono sfarfallati 2 Imenotteri Calcididi ⁽⁴⁾

Monodontomerus aereus Walk.

Dibrachys boucheanus Ratz.

IMENOTTERI

13. **Diastrophus rubi** Hartig

(Cynipoidea)

Nei mio primo contributo ho riferito che si sono ottenuti nel nostro Istituto da questo Cinipide 2 Calcididi parassiti: **Callimome rubi** Schr. e **Ormyrus punctiger** Westw.

⁽¹⁾ Classificato dal Dott. J. VILLENEUVE DE JANTI.

⁽²⁾ » » » » » »

⁽³⁾ » » Sig. E. SÉGUY.

⁽⁴⁾ Classificati dal Prof. L. MASI.

Quest'anno oltre a tali specie sono sfarfallati dalle galle di *Rubus fruticosus* determinate da detto Cinipide e raccolte nelle colline bolognesi altre due specie di Imenotteri Calcididi ⁽¹⁾:

Callimome (*Syntomaspis*) **littorale** Walk.
(= *S. caudata* auct.)

Olinx lineaticeps Mayr

14. **Cynips coriaria** Haimh.

(Cynipoidea)

L'allevamento di questo Cinipide, da galle provenienti da Fano, ha fornito 2 specie di Imenotteri Calcididi ⁽²⁾ parassiti:

Megastigmus stigmatizans (F.)

Olinx trilineata Mayr

⁽¹⁾ Classificati dal Prof. L. MASI.

⁽²⁾ » » » » »